



Asociación Urológica de  
Centroamérica y el Caribe

## Caso Clínico. Condiloma Acuminado.

### *A case report.*

### *Condylomata acuminata.*

Dr. Mario Morales Ruiz<sup>1</sup>; Dr. Juan Pablo Lezana<sup>1</sup>; Dr. Víctor Hernández<sup>1</sup>; Dr. Mario Montejó<sup>1</sup>; Dr. Nestor Carrillo<sup>1</sup>; Dr. Fredy López<sup>1</sup>.

(1) Servicio de Urología, Hospital General San Juan de Dios.

#### RESUMEN

Son un tipo de lesiones a nivel genital, ásperas y duras con un aspecto de coliflor, suelen estar acompañados de hidrocele más una masa paratesticular o epididimaria.

#### PALABRAS CLAVE

Verruga, Anogenital.

#### ABSTRACT

They are a type of lesions at the genital level, rough and hard with a cauliflower-like appearance, they are usually accompanied by a hydrocele plus a paratesticular or epididymal mass

#### KEYWORDS

Anogenital, Warts.

#### CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 10 meses de edad, segundo hijo de religión evangélico, originario y residente zona 21, capital. Quien consulto por Lesiones en pene de 4 meses de evolución.

Madre de paciente refiere que hace 4 meses inicia con lesiones en prepucio que fueron aumentando de tamaño y que no mejora con la aplicación de cremas tópicas consulta a facultativo quien la refiere a este hospital.

#### ANTECEDENTES

- Ambos padres sin antecedentes de papilomatosis, pruebas de VIH y Hepatitis B negativas.
- Es cuidado únicamente por la abuela.
- Se documenta y descarto abuso sexual.

Examen físico lesiones a nivel genital áspera y duros apareciendo un aspecto de coliflor (figuras 1,2).



Figura No. 1



Figura No. 2

Paciente es llevado a sala de operaciones (figura 3).



**Figura No. 3**

### CONCLUSION

Este tipo de tumores se suelen acompañar de hidrocele, ante el hallazgo de una hidrocele + masa

paratesticular o epididimaria, confirmatoria por el examen físico y medios de diagnóstico por imagen, es recomendable la exéresis de la hidrocele y de la masa del epidídimo y evitar orquidectomias innecesarias, a menos que la masa infiltre el testículo.

### BIBLIOGRAFÍA

1. Kirby P, Dunne A, King DH, Corey L. Double-blind randomized clinical trial of self-administered podofilox solution versus vehicle in the treatment of genital warts. *Am J Med* 1990;88:465-469. [PubMed]. [https://doi.org/10.1016/0002-9343\(90\)90424-C](https://doi.org/10.1016/0002-9343(90)90424-C)
2. Lowy DR, Androphy EJ. Warts. En: Fitzpatrick's dermatology in general medicine. 5ª ed. New York: McHraw Hill; 1999. p.2484-2497.
3. Von Krogh G, Longstaff E. Podophyllin office therapy against condyloma should be abandoned. *Sex Transm Infect* 2001;77:409-12. 28. <https://doi.org/10.1136/sti.77.6.409>
4. Scheinfeld JD, Lehman DS. An evidence-based review of medical and surgical treatments of genital warts. *Dermatol Online J* 2006;12(3):5. 29. <https://doi.org/10.5070/D37V57P744>
5. Kodner CM, Nasraty S. Management of genital warts. *Am Fam Physician* 2004; 70:2335-42.

Copyright (c) 2016 Mario Morales Ruiz; Juan Pablo Lezana; Víctor Hernández; Mario Montejo; Néstor Carrillo; Fredy López.



Este texto está protegido por una licencia [Creative Commons 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Usted es libre para Compartir —copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato— y Adaptar el documento —remezclar, transformar y crear a partir del material— para cualquier propósito, incluso para fines comerciales, siempre que cumpla la condición de:

Atribución: Usted debe dar crédito a la obra original de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace de la obra.

[Resumendelicencia - Textocompletodelalicencia](#)